

INSTRUCCIONES DESPUÉS DE CIRUGÍA ENDODÓNTICA

1. Aplicar compresas de hielo al área de tratamiento por lo menos **20 MINUTOS cada media hora** por un promedio de **48 a 72 horas siguientes al tratamiento**
2. **Para prevenir lastimar los puntos o cirugía:**
 - a) No se levante el labio para mirar la zona de cirugía.
 - b) No se cepille el área de tratamiento. Cepílese las otras áreas de la boca y use enjuague mezclado con agua, (ejemplo: Listerine), **CON MUCHA SUAVIDAD.**
3. No coma nada duro (ejemplo: tostadas) o nada que requiera masticar mucho (Ej.: bistec) por los siguientes 3-5 días después de la cirugía. Coma una dieta suave como: huevos, puré de papas, sopas, batidos, etc. Use suplementos de dieta o vitaminas como desee.
4. Después de 48 horas, puede empezar a enjuagarse con agua tibia mezclada con sal. Con mucha precaución. (1/2 cucharadita de sal en 1 vaso de agua).
5. Si tiene sangramiento, aplique una compresa de hielo con presión continua sobre el área hasta que el sangramiento pare.
6. No falte a ninguna cita que tenga para visitar al Doctor. Es importante que se remuevan los puntos a su debido tiempo indicado por el Doctor para evitar una infección. Las visitas de chequeo adicional, serán hechas sin costo alguno al paciente para poder evaluar si la curación es adecuada.
7. Siempre siga las instrucciones del Doctor al pie de la letra en referencia a las medicinas que le indique como **ANTIBIOTICOS y ANALGESICOS.**
8. No tenga pena o temor de llamar al Doctor con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener.

MEDICACIONES INDICADAS:

TOMAR:

EMPEZAR:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____